

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ ДИСБАКТЕРІОЗОМ КИШЕЧНИКУ

Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О.

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" (Полтава)

Нами проведена оцінка стану твердих тканин зубів у дітей 2-3 років із дисбактеріозом кишечника. Поширеність та інтенсивність карієсу в дітей 2-3 років, які мають дисбактеріоз кишечника вірогідно вищі, ніж у дітей контрольної групи ($p < 0,05$). Ускладнення карієсу виявлені в дітей із дисбактеріозом уже у 2 роки, а в 3 роки цей показник в 2,75 разу вищий, ніж у контрольній групі. Виявлено, що перебіг карієсу в дітей із дисбактеріозом кишечника розвивається на фоні погіршення гігієни порожнини рота, зниження швидкості слиновиділення, погіршення мікрокристалізації ротової рідини, зниження вмісту кальцію, неорганічного фосфору, рН, що створює карієсогенну ситуацію в порожнині рота в дітей цієї групи. Нами досліджена активність лізоциму та уреаз ротової рідини, визначений ступінь дисбіозу, що засвідчує наявність у дітей із дисбактеріозом кишечника клінічно субкомпенсованої стадії дисбіозу порожнини рота. Отримані дані спонукають до розробки та проведення заходів, спрямованих покращення показників гомеостазу порожнини рота у дітей із дисбактеріозом кишечника.

Для підвищення резистентності емалі тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишечника пропонується лікувально-профілактичний комплекс, що охоплює:

- диспансерний нагляд у лікаря-педіатра, який передбачає постійне спостереження та своєчасне виявлення дисбактеріозу кишечника, його лікування і проведення профілактичних заходів із метою запобігання виникненню рецидивів;

- диспансерний нагляд у лікаря-стоматолога:

- лікування карієсу і його ускладнень;

- навчання індивідуальній гігієні порожнини рота з використанням зубної пасти "Дракоша";

- застосування препарату "Остеовіт" у вигляді аплікацій на тверді тканини зуба (1 кавова ложка порошку "Остеовіт" у 1/3 кавової ложки води) протягом 15 хв. 1-2 рази за день;

- використання лікувально-профілактичного зубного еліксиру "Санодент" у вигляді полоскань (1 чайна ложка на 1/4 стакана води), 3-4 рази за день після вживання їжі та перед сном;

- пероральне вживання полівітамінного препарату "Кіндер біовіталь гель" по 1 чайній ложці 1 раз за добу.

Лікувально-профілактичний комплекс доцільно призначати протягом місяця двічі за рік. Клінічну оцінку ефективності лікувально-профілактичного комплексу рекомендовано проводити за визначенням показника приросту інтенсивності карієсу.