

УДК 616.124.2/127-007/-008: [616.441-008.64+616.127-005.4+616-002-031.81]-06] DOI: 10.22141/2224-0721.15.2.2019.166104

Городинська О.Ю., Бобирьова Л.Є., Весніна Л.Е., Ізмайлова О.В., Баранова А.Ф.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка при гіпотиреозі й ішемічній хворобі серця на тлі хронічного системного запалення

Резюме. Актуальність. Дисфункція щитоподібної залози у сучасній медичній науці розглядається як один із факторів ризику серцево-судинних захворювань, на жаль, непередбачливо недооцінюваний. Відомо, що навіть незначні порушення тиреоїдної функції можуть супроводжуватися зростанням кардіометаболічного ризику. Гіпотиреоз вже на ранній (субклінічній) стадії серйозно впливає на формування і розвиток серцево-судинних захворювань. Результати масштабних досліджень демонструють, що субклінічний гіпотиреоз асоціюється з підвищенням ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), інфаркту міокарда і смертності від серцево-судинних захворювань. **Мета дослідження** — вивчення структурно-функціонального стану міокарда лівого шлуночка при гіпотиреозі та ішемічній хворобі серця на тлі хронічного системного запалення. **Матеріали та методи.** Проаналізовано 140 історій хвороб та обстежено 55 хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов поєднаної патології. Пацієнти були розподілені на 3 групи: I група — хворі на гіпотиреоз — 81, II група — хворі на ІХС — 67, III група — хворі на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС — 67. Групу контролю становили 20 осіб віком від 20 до 25 років. **Результати.** Виявлено, що гіпертрофія міокарда розвивається у всіх групах хворих, зниження функції щитоподібної залози характеризується ремоделюванням міокарда лівого шлуночка з розвитком ексцентричної гіпертрофії, з прогресуванням систолічної дисфункції серця в умовах коморбідності. Виявлений прямий кореляційний зв'язок зниження фракції викиду з підвищенням рівня ІЛ-8. **Висновки.** Активація хронічного системного запалення більш виражена в умовах коморбідності з негативним прогностичним впливом на стан серцево-судинної системи. Зниження функції щитоподібної залози призводить до розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка з подальшою зміною геометрії серця в бік розвитку ексцентричного ремоделювання. Гіпотиреоз характеризується порушенням центральної гемодинаміки, прояви систолічної дисфункції серця наростають за умов поєднання тиреоїдної патології та ІХС. Активація хронічного системного запалення більш виражена в умовах коморбідності з негативним прогностичним впливом на стан серцево-судинної системи. **Ключові слова:** щитоподібна залоза; серце; гіпотиреоз; гіпертрофія міокарда; лівий шлуночок; прозапальні цитокіни

Вступ

Дисфункція щитоподібної залози (ЩЗ) у сучасній медичній науці розглядається як один із факторів ризику серцево-судинних захворювань, на жаль, непередбачливо недооцінюваний [1–3].

На сьогодні проведено досить багато досліджень, присвячених механізму впливу зниженої функції ЩЗ на серцево-судинну систему. Відомо, що навіть незначні порушення тиреоїдної функції можуть супроводжуватися зростанням кардіометаболічного

ризиком [4, 5]. Показано, що гіпотиреоз вже на ранній (субклінічній) стадії серйозно впливає на формування і розвиток серцево-судинних захворювань (ССЗ) [6, 7]. Результати масштабних досліджень демонструють, що субклінічний гіпотиреоз асоціюється з підвищенням ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності і смертності від ССЗ незалежно від статі, віку і попередніх серцево-судинних захворювань [8]. Існують наукові дані про

© «Міжнародний ендокринологічний журнал» / «Международный эндокринологический журнал» / «International Journal of Endocrinology» («Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal»), 2019
© Видавець Заславський О.Ю. / Издатель Заславский А.Ю. / Publisher Zaslavsky O.Yu., 2019

Для кореспонденції: Гординська Олена Юрївна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», вул. Шевченка, 34, м. Полтава, 36011, Україна; e-mail: lena.gorodinskaya@gmail.com

For correspondence: Olena Horodynska, Assistant at the Department of internal medicine 1, State Higher Education Institution of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy", Shevchenko st., 23, Poltava, 36011, Ukraine; e-mail: lena.gorodinskaya@gmail.com

взаємозв'язок гіпотиреозу з такими «новими» факторами ризику атеросклерозу, як С-реактивний білок, ендотеліальна дисфункція, хронічне системне запалення, прокоагулянтні зміни крові тощо [9, 10].

Однак поширеність указаних факторів ризику у хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов поєднаної патології, їх зв'язок зі станом серцево-судинної системи на тлі дефіциту тиреоїдних гормонів потребують більш детального вивчення.

Мета дослідження — вивчення структурно-функціонального стану міокарда лівого шлуночка при гіпотиреозі та ІХС на тлі хронічного системного запалення.

Матеріали та методи

Для формування основної групи був проведений скринінговий аналіз історій хвороб пацієнтів, що лікувались в ендокринологічному та кардіологічному відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського у 2006–2015 роках. Для подальшого дослідження відібрано 140 історій хвороб пацієнтів із гіпотиреозом, кардіальною та кардіотиреоїдною патологією. Наступний етап рандомізації проводився безпосередньо з пацієнтами, які лікувались у даних відділеннях. На підставі аналізу скарг, анамнезу, фізикального дослідження пацієнта, даних лабораторно-інструментальним методом, аналізу відповідності критеріям включення/вилучення було відібрано 55 осіб.

Пацієнтів було розподілено на 3 групи: I група — хворі на гіпотиреоз — 81 (жінки — 72, чоловіки — 9, віком $46,0 \pm 6,1$ року), II група — хворі на ІХС — 67 (жінки — 27, чоловіки — 40, віком $59,0 \pm 8,8$ року), III група — хворі на гіпотиреоз у поєднанні з ІХС — 67 (жінки — 39, чоловіки — 28, віком $55,0 \pm 7,5$ року). Групу контролю становили 20 осіб віком від 20 до 25 років.

Критеріями включення хворих у дослідження були: діагноз первинний «гіпотиреоз», післяопераційний гіпотиреоз, гіпотиреоз на тлі аутоімунного тиреоїдиту, ІХС: стабільні форми стенокардії напруження ФК I–III, кардіосклероз атеросклеротичний та післяінфарктний, а також поєднана патологія, відсутність декомпенсованих хронічних ускладнень і супутніх захворювань.




Рисунок 1. Порівняння функціонального стану щитоподібної залози в обстежених осіб

Діагноз захворювання було верифіковано на підставі клінічних проявів захворювання, даних загальноклінічних, біохімічних, інструментальних методів дослідження.

Тиреотропний гормон (ТТГ) і гормони ЩЗ (вільний трийодтиронін, вільний тироксин), антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) визначали імуноферментним методом (набір фірми «Хема-Медика», Росія).

Концентрацію інтерлейкіну-1 β , інтерлейкіну-8 визначали методом імуноферментного аналізу в сироватці крові (АТ «Вектор-Бест», Росія).

Ехокардіографічне дослідження проводили на ультразвуковому діагностичному сканері Vivid S60N виробника GE Wingmed (Норвегія) за стандартною методикою, керуючись рекомендаціями Американського та Європейського товариства ехокардіографії.

Отримані дані оброблено методом варіаційної статистики з використанням програми Microsoft Excel, Statistica 10.0 for Windows. Різницю вважали вірогідною при $p < 0,05$.

Результати

Група хворих на гіпотиреоз характеризується вірогідним підвищенням рівня ТТГ $10,6 (2,0; 28,9)$ мМО/л ($p < 0,05$), що свідчить про зниження функції ЩЗ порівняно з групою здорових осіб. Дана тенденція відзначається і в групі хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС: ТТГ — $5,3 (1,9; 19,3)$ мМО/л ($p < 0,05$). Оцінюючи функцію ЩЗ у хворих на ІХС при порівнянні з групою здорових осіб, вірогідних відмінностей між показниками не виявлено: вільний трийодтиронін (FT_3) — $4,19 \pm 0,91$ пмоль/л, вільний тироксин (FT_4) — $16,18 \pm 2,31$ пмоль/л, ТТГ — $2,06 (1,47; 2,6)$ мМО/л, що характеризують збережену функцію ЩЗ.

За даними ЕхоКГ, у хворих на гіпотиреоз відзначається потовщення стінок міокарда лівого шлуночка, на що вказує вірогідне підвищення показників розмірів міжшлуночкової перегородки (МШП) — $10,30 \pm 0,82$ мм ($p < 0,05$) та задньої стінки лівого шлуночка (ЗСЛШ) — $10,27 \pm 0,82$ мм ($p < 0,05$). До того ж на гіпертрофію лівого шлуночка вказує підвищення показника маси міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) $198,91 \pm 10,42$ г ($p < 0,05$), індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) $104,04 \pm 10,89$ г/м² ($p < 0,05$) та відносної товщини стінки (ВТС) ЛШ $0,41 \pm 0,05$ см ($p < 0,05$), порівнюючи з групою здорових осіб. Дані зміни характеризують прогресування процесів гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та зміни геометрії серця у хворих на гіпотиреоз, при цьому відмічалось вірогідне зниження фракції викиду (ФВ) до $53,44 \pm 1,94$ ($p < 0,05$) порівняно з групою контролю, що вказує на порушення центральної гемодинаміки при зниженні функції ЩЗ.

Діагностичний критерій гіпертрофії міокарда ЛШ: значення ІММЛШ — понад 115 г/м² у чоловіків та 95 г/м² — у жінок [11].

У хворих на ІХС розміри МШП становлять $11,67 \pm 0,75$ мм ($p < 0,05$) та ЗСЛШ — $11,47 \pm 0,71$

Таблиця 1. Показники ехокардіографії в обстежених хворих

Показники	I група (n = 81)	II група (n = 67)	III група (n = 47)	Контроль (n = 20)
МШП, мм	10,30 ± 0,82*	11,67 ± 0,75*	11,20 ± 0,73*	7,95 ± 0,53
ЗСЛШ, мм	10,27 ± 0,82*	11,47 ± 0,71*	10,90 ± 0,78*	8,10 ± 0,51
ММЛШ, г	198,91 ± 10,42*	244,68 ± 7,82*	234,06 ± 6,93*	131,93 ± 2,96
ИММ ЛШ, г/м ²	104,04 ± 10,89*	128,25 ± 5,19*	120,4 ± 5,0*	78,07 ± 3,06
ВТС ЛШ, см	0,41 ± 0,05*	0,47 ± 0,05*	0,42 ± 0,07*	0,32 ± 0,03
ФВ, %	53,44 ± 1,94*	53,88 ± 1,61*	49,9 ± 2,1* [#]	62,41 ± 0,51

Примітки: * — $p < 0,05$ — різниця вірогідна з показниками здорових осіб; # — $p < 0,05$ — різниця вірогідна з показниками I та II групи.

($p < 0,05$), що вірогідно перевищує відповідні показники в групі контролю. Більш виражені прояви ремоделювання лівого шлуночка в II групі характеризувались збільшенням показників: ММ ЛШ — $244,68 \pm 7,82$ г ($p < 0,05$), ИММ ЛШ — $128,25 \pm 5,19$ г/м² ($p < 0,05$), ВТС ЛШ — $0,47 \pm 0,05$ см ($p < 0,05$). ФВ у даної групи хворих становила $53,88 \pm 1,61$ % ($p < 0,05$).

За умов коморбідності III група хворих характеризувалась знову ж таки ознаками гіпертрофії міокарда ЛШ (МШП — $11,20 \pm 0,73$ мм ($p < 0,05$), ЗС ЛШ — $10,90 \pm 0,78$ мм ($p < 0,05$), ММЛШ — $234,06 \pm 6,93$ г ($p < 0,05$), ИММ ЛШ — $120,4 \pm 5,0$ г/м² ($p < 0,05$), ВТС ЛШ — $0,42 \pm 0,07$ см ($p < 0,05$)), порівнюючи з контрольною групою, проте показник ФВ, що становить $49,9 \pm 2,1$ % ($p < 0,05$), вірогідно знижений порівняно з I та II групами (табл. 1).

Оцінюючи значення ИММЛШ і ВТС за A. Ganau [12], виділили такі типи ремоделювання ЛШ:

- нормальну геометрію ЛШ — ИММ ЛШ у межах норми і ВТС менше 0,45;
- концентричне ремоделювання ЛШ — ИММ ЛШ у межах норми і ВТС понад 0,45;
- концентричну гіпертрофію ЛШ — ИММ ЛШ більший від норми і ВТС понад 0,45;
- ексцентричну гіпертрофію ЛШ — ИММ ЛШ більше норми і ВТС менше 0,45.

Аналізуючи типи ремоделювання ЛШ у пацієнтів із гіпотиреозом, встановили: у 38 осіб (46,92 %) — нормальну геометрію серця, у 31 особи (38,27 %) — ексцентричну гіпертрофію, у 11 осіб (13,58 %) — концентричну гіпертрофію і в 1 особи (1,23 %) — концентричне ремоделювання (рис. 2).

У хворих на ІХС: у 13 осіб (19,4 %) — нормальну геометрію серця, у 13 осіб (19,4 %) — ексцентричну гіпертрофію, у 38 осіб (56,7 %) — концентричну гіпертрофію і в трьох осіб (4,5 %) — концентричне ремоделювання (рис. 3).

У III групі: у 6 осіб (10,7 %) — нормальну геометрію серця, у 30 осіб (63,8 %) — ексцентричну гіпертрофію, у 10 осіб (21,3 %) — концентричну гіпертрофію і у двох осіб (4,2 %) — концентричне ремоделювання (рис. 4).

Оцінюючи показники прозапальних цитокінів (ІЛ-1 β та ІЛ-8) в обстежуваних хворих порівняно з групою здорових осіб, не виявили вірогідної різниці між даними групами за показником ІЛ-1 β . Однак,



Рисунок 2. Типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз




Рисунок 3. Типи ремоделювання серця у хворих на ІХС




Рисунок 4. Типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз у поєднанні з ІХС




Рисунок 5. Рівні прозапальних цитокінів в обстежених хворих

порівнюючи значення ІЛ-8, відзначили вірогідне збільшення даного показника в групі хворих на гіпотиреоз — $4,78 \pm 1,63$ пг/мл ($p < 0,01$) та за умов коморбідності — $7,66 \pm 1,63$ пг/мл ($p < 0,01$) порівняно з групою здорових осіб — $3,02 \pm 2,6$ пг/мл. У групі хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС виявлено прямий кореляційний зв'язок середньої сили між рівнем ІЛ-8 та ФВ ($r = 0,38$).

Обговорення

Ураховуючи отримані дані, виявили, що гіпертрофія міокарда розвивається у всіх групах хворих, обумовлюючи розвиток змін геометрії серця. Для хворих на гіпотиреоз характерне ремоделювання міокарда ЛШ у бік розвитку ексцентричної гіпертрофії, що можна вважати маркером гіпотиреоїдного серця, вираженість якого може визначати ступінь тяжкості гіпотиреозу. У хворих на ІХС відзначається переважання концентричної гіпертрофії міокарда ЛШ. У III групі хворих спостерігається зміна геометрії серця в бік розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда, що супроводжується вірогідним зниженням ФВ із наростанням систолічної дисфункції ЛШ. Також виявлений прямий зв'язок зниження ФВ із підвищенням рівня ІЛ-8 свідчить, що персистування прозапального стану у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС є негативним прогностичним фактором.

Отримані дані збігаються з результатами інших авторів, які довели, що ІХС на тлі гіпотиреозу характеризується розвитком порушення систолічної та діастолічної функції серця, тяжкість якої прогресує зі збільшенням функціональної недостатності ЩЗ [13, 14]. Характерними ЕхоКГ-ознаками є потовщення стінок і збільшення маси міокарда, вираженість яких пов'язана з тяжкістю тиреоїдної дисфункції [14–16]. Процеси ремоделювання серця у хворих на ІХС із гіпотиреозом пов'язані з переважанням розвитку концентричної гіпертрофії та збільшенням кількості хворих з ексцентричною гіпертрофією ЛШ [17].

Висновки

1. Зниження функції щитоподібної залози призводить до розвитку гіпертрофії міокарда ЛШ з подальшою зміною геометрії серця в бік розвитку ексцентричного ремоделювання.

2. Гіпотиреоз характеризується порушенням центральної гемодинаміки, прояви систолічної дисфункції серця наростають за умов поєднання тиреоїдної патології та ІХС.

3. Активація хронічного системного запалення більш виражена в умовах коморбідності з негативним прогностичним впливом на стан серцево-судинної системи.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Список літератури

1. Мітченко О.І. Оптимізація лікування дисліпідемій та порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози / О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов // Український кардіологічний журнал. — 2010. — № 1. — С. 73-80.
2. Gallo D. Masked hypertension in a cohort of newly diagnosed hypothyroid patients / D. Gallo, E. Piantanida, N. Pariani // Eur. Thyroid J. — 2014. — Vol. 3 (Suppl 1). — P.148.
3. Kyoung I.C. The impact of subclinical thyroid dysfunction on coronary vasospasm in patients without associated cardiovascular risk factors / I.C. Kyoung, B.H. Ki // Eur. Thyroid J. — 2014. — Vol. 3 (Suppl 1). — P. 147.
4. Гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания / З.Н. Бланкова, Ф.Т. Агеев, Е.М. Середина [и др.] // Рус. мед. журн. — 2014. — № 13. — С. 980-987.
5. Старкова Н.Т. Клиническая эндокринология [Текст] / Н.Т. Старкова. — СПб.: Путер, 2002. — 576 с.
6. Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: The Rotterdam Study / A.E. Hak, H.A.P. Pols, T.J. Visser [et al.] // Ann. Intern. Med. — 2000. — Vol. 132. — P. 270-278.
7. Subclinical hypothyroidism is associated with a low-grade inflammation, increased triglyceride levels and predicts cardiovascular disease in males below 50 years / J. Kvetny, P.E. Heldgaard, E.M. Bladbjerg, J. Gram // Clin. Endocrinol. — 2004. — Vol. 61. — P. 232-238.
8. Rodondi N. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality / N. Rodondi, W.P. den Elzen, D.C. Bauer // JAMA. — 2010. — Vol. 304(12). — P. 1365-1374.
9. Феськова А.А. Значение субклинического гипотиреоза в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы: (обзор лит.) / А.А. Феськова, Е.С. Добрышева // Молодой ученый. — 2014. — № 17. — С. 207-210.
10. Родионова Т.И. Роль гормонов щитовидной железы в регуляции обменных процессов миокарда / Т.И. Родионова, В.В. Самитин // Saratov Journal of Medical Scientific Research. — 2009. — Vol. 5, № 1. — P. 123-127.
11. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. 2013. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, R. Fagard, K. Narkiewicz [et al.] // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31. — P. 1281-1357.
12. Patterns of left ventricular hypertrophy in essential hypertension / A. Ganau, R.B. Devereux, M.J. Roman [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 1992. — Vol. 12. — P. 1550-1558.

13. Аронов Д.М. Атеросклероз и коронарная болезнь сердца / Д.М. Аронов, В.П. Лупанов. — М.: Триада-Х, 2009. — 248 с.

14. Будневский А.В. Гипотиреоз и сердечно-сосудистая патология / А.В. Будневский, В.Т. Бурлачук, Г.И. Грекова // Медицинский научный и научно-методический журнал. — 2007. — № 38. — С. 85-105.

15. Volkova A. Predictive risk model of severe coronary atherosclerosis in heart ischemic disease patients with subclinical hypothyroidism / A. Volkova, S. Dora, O. Berkovich // Eur. Thyroid J. — 2014. — 3 (Suppl 1). — P. 152.

16. Thyroid Function Is Intrinsically Linked to Insulin Sensitivity and Endothelium-Dependent Vasodilation in Healthy Euthyroid Subjects / J.M. Fernandez-Real et al. // J. Clin. Endocrinol. Vyssoulis. — 2006. — Vol. 91, № 9. — P. 3337-3343.

17. Михайловська Н.С. Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози / Н.С. Михайловська, Т.В. Олійник // Патологія. — 2015. — № 2(34). — С. 17-21.

Отримано 13.02.2019 ■

Городинская Е.Ю., Бобырева Л.Е., Веснина Л.Э., Измайлова О.В., Баранова А.Ф.
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина

Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка при гипотиреозе и ишемической болезни сердца на фоне хронического системного воспаления

Резюме. *Актуальность.* Дисфункция щитовидной железы в современной медицинской науке рассматривается как один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, к сожалению, непредусмотрительно недооцениваемый. Известно, что даже незначительные нарушения тиреоидной функции могут сопровождаться ростом кардиометаболического риска. Гипотиреоз уже на ранней (субклинической) стадии оказывает серьезное влияние на формирование и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты масштабных исследований демонстрируют, что субклинический гипотиреоз ассоциируется с повышением риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. *Цель исследования* — изучение структурно-функционального состояния миокарда левого желудочка при гипотиреозе и ИБС на фоне хронического системного воспаления. *Материалы и методы.* Проанализированы 140 историй болезни и обследованы 55 больных гипотиреозом, ИБС и в условиях сочетанной патологии. Пациенты были распределены на 3 группы: первая группа — больные гипотиреозом — 81, вторая — больные ИБС — 67, третья — больные гипотиреозом в сочетании с ИБС — 67. Группу контроля составили 20 лиц в возрасте от 20 до 25 лет. *Результаты.* Обнаружено, что гипертрофия миокарда

развивается во всех группах больных, снижение функции щитовидной железы характеризуется ремоделированием миокарда левого желудочка с развитием эксцентрической гипертрофии, с прогрессированием систолической дисфункции сердца в условиях коморбидности. Обнаружена прямая корреляционная связь между снижением фракции выброса и повышением уровня ИЛ-8. **Выводы.** Активация хронического системного воспаления более выражена в условиях коморбидности с негативным прогностическим влиянием на состояние сердечно-сосудистой системы. Снижение функции щитовидной железы приводит к развитию гипертрофии миокарда левого желудочка с последующим изменением геометрии сердца в сторону развития эксцентрического ремоделирования. Гипотиреоз характеризуется нарушением центральной гемодинамики, проявления систолической дисфункции сердца нарастают при условиях сочетания тиреоидной патологии и ишемической болезни сердца. Активация хронического системного воспаления более выражена в условиях коморбидности с отрицательным прогностическим влиянием на состояние сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: щитовидная железа; сердце; гипотиреоз; гипертрофия миокарда; левый желудочек; провоспалительные цитокины

O.Yu. Horodynska, L.E. Bobyrova, L.E. Vesnina, O.V. Izmailova, A.F. Baranova
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine

Features of left ventricular remodeling in hypothyroidism and ischemic heart disease on the background of chronic systemic inflammation

Abstract. *Background.* Thyroid dysfunction in modern medical science is regarded as one of the risk factors for cardiovascular diseases, unfortunately, unwittingly underestimated. It is known that even insignificant violations of thyroid function can be accompanied by the increased cardiometabolic risk. Hypothyroidism already on the early (subclinical) stage has a significant influence on formation and development of cardiovascular diseases. The results of large researches demonstrate that subclinical hypothyroidism is associated with increased risk for the development of ischemic heart disease, myocardial infarction and death rate from cardiovascular diseases. The purpose of this research is to study the structural and functional status of the left ventricular myocardium in hypothyroidism, ischemic heart disease and in comorbidity. *Materials and methods.* One hundred and forty clinical records were analyzed and 55 patients with hypothyroidism, ischemic heart disease and combined pathology were examined. They were divided into 3 groups: the first group — 81 patients with hypothyroidism, the second group — 67 individuals with ischemic heart disease, and the third group — 67 people with combination of hypothyroidism and ischemic

heart disease. Control group included 20 persons aged 20 to 25 years. **Results.** It was found that myocardial hypertrophy developed in all groups of patients; the decrease of thyroid function is characterized by myocardial remodeling with the development of eccentric hypertrophy, with the progression of systolic dysfunction in case of comorbidity. A direct correlation was found between reduced ejection fraction and higher levels of interleukin-8. **Conclusions.** Activation of chronic systemic inflammation is more significant in comorbidity, with negative prognostic influence on the state of the cardiovascular system. The decline of thyroid function results in the development of left myocardial hypertrophy with subsequent changes in cardiac geometry towards eccentric remodeling. Hypothyroidism is characterized by impaired central hemodynamics; manifestations of systolic dysfunction are increased in combination of thyroid pathology and ischemic heart disease. Activation of chronic systemic inflammation is more significant in comorbidity, with negative prognostic influence on the state of the cardiovascular system.

Keywords: thyroid gland; heart, hypothyroidism; myocardial hypertrophy; left ventricle; proinflammatory cytokines