на шестой день у одного больного, на седьмой и восьмой по одному больному. К концу лечения у всех 100% больных улучшилось самочувствие. Отрицательных явлений во время лечения не наблюдалось. Показатели холестерина, триглицеридов, общих липидов снизились к концу лечения у пяти больных, у двух остались на прежнем уровне.

Полученные данные позволяют заключить, что наряду с традиционными /медикаментозными/ методами лечения больных тиреоидитом терапия биоэнергоинформационным методом С.А.Губкина-Матейски даёт положительные результаты и может быть применён под контролем врача и лабораторных методов исследования.

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ ЦЕЛИТЕЛЯ С.А.ГУБКИНА-МАТЕЙСКИ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМ БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

З.К.Моргун, С.А.Горбенко, А.В.Санник

Представлялось интересным проверить какие изменения электрической активности головного мозга можно зарегистрировать у целителя во время проведения им биоэнергоинформационного воздействия. С этой целью у целителя С.А.Губкина-Матейски нами произведена запись электроэнцефалограммы/ЭЭГ/ в состоянии покоя и во время проводимого им сеанса биоэнерготерапии.

В контрольных ЭЭГ мы зарегистрировали альфа-ритм с частотой 9-10 Гц и амплитудой 20-30 мкВ. Низкоамплитудные ритмы указывают на доминирование в мозгу десинхронизирующих влияний с преобладанием активирующих восходящих неспецифических систем, что коррелирует с повышенной поведенческой реакцией, повышенной психической возбудимостью. При афферентном раздражителе /свет/ возникали явления десинхронизации альфа-ритма.

В ЭЭГ, записанных во время биоэнерговоздействия целителя на пациента отмечалось снижение в затылочных областях амплитуды альфа-ритма без его десинхронизации. В записи появились отдельные периоды электрического молчания длительностью 1,0-1,5 секунды в разных областях, наиболее интенсивно в задне-лобной области справа /на двадцатой секунде воздействия/. В этой же области, начиная с

16-секунды в течение 21 секунды регистрировалось пять периодов электрического молчания длительностью 0,5-1,0 секунды.Сразу после такого отключения регистрировались движения глазного яблока с частотой два-три колебания в секунду,в затылочной же области - веретенообразный альфа-ритм с частотой 9 Гц,более выраженный справа.В лобных и центральных областях усиливались частота бетта-ритма.

В момент экстраполяции в течение 36 секунд регистрировались высокоамплитудные колебания,схожие на пульсовую волну в правой височной области.Движения глазного яблока в этот момент не регистрировались.Через 5 секунд наблюдалось усиленное / с частотой 3,5 Гц/ движение глазного яблока.

Таким образом,проведенные исследования подтвердили представление о возможных изменениях электрической активности головного мозга биоэнергооператора в момент проведения им сеанса терапии.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЛОЧНОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ

Проф.И.Чурков,доц.В.Братанова,З.Денкова

Пловдив/Болгария/,институт вкусовой промышленности

2 сентября 1995 года целителем С.А.Губиным-Матейски/Украина/ было проведено энергоинформационное воздействие на 10 проб бактерий/молочнокислые бактерии видов стрептококус термофилиус и лактобацилус булгарикус/,выращенных в молоке и находящихся в логарифмической базе роста.Пять пробирок обработано левой и пять - правой рукой.Продолжительность воздействия была от 3 до 15 минут с интервалом в 3 минуты.Контрольные пробы не подвергали влиянию и они находились в другой комнате.Воздействие проведено в одной серии "нулевой",в другой -"отрицательной" энергией /по классификации С.А. Губкина-Матейски/.Сразу же после воздействия из каждой пробирки они сделали посев в стерильное молоко /по 0,2 мл на 10 мл/.Пробирки с посевами были помещены в термостат при температуре 45°С на 16 часов.В качестве предварительного показателя наличия биоэнерговоздействия использовано изменение кислотности проб опытных и конт-