

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ  
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ**

**30-РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ**

**ПЕРШИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС  
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ**

**(ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ)**

**(19-21 вересня 1995 р.)**

Дніпропетровськ - 1995

# ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ЖІНОК З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИОКСИДАНТІВ

*І. В. Редчиць, Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров, К. В. Бажан, З. О. Борисова,  
Л. Г. Селіхова, С. І. Треумова, В. Г. Кулакова (Полтава)*

Наше дослідження присвячене вивченню впливу комплексної терапії з використанням антиоксидантів (АО) на перебіг виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (ВХДК) у жінок.

З цією метою застосовувався для 31 жінки антиоксидантний комплекс (аевіт і аскорбінова кислота) на фоні базисної терапії (дієта N 1, холінолітики, антациди, фізіотерапевтичні процедури, ЛФК). Аевіт призначався по 1 капсулі 3 рази на добу, аскорбінова кислота - по 0,05 г 3 рази на добу протягом 3 тижнів у зимово-весняний період, а у літньо-осінній період - цей же комплекс більш коротким курсом (протягом 2 тижнів). Для контролю була взята ідентична група хворих у той же період року.

У процесі динамічного, спостереження встановлено, що у жінок з наявною ВХДК, які вживали АО, швидше ліквідувались клінічні прояви хвороби. Зокрема, середні строки усунення больового синдрому були статистично достовірно менші ( $p < 0,05$ ). У осіб цієї групи відмічалось більш раннє, загоювання виразкового дефекту. Через рік після лікування рецидиви ВХДК у жінок, які отримували АО, спостерігались рідше. Ефективність антиоксидантного комплексу також була підтверджена вираженим інгібуванням процесів перекисного окислення ліпідів.

Отримані результати дають підставу рекомендувати включення АО у курс базисної терапії жінок з ВХДК. Включення АО в комплексну терапію слід проводити як в умовах стаціонару, так і при проведенні протирецидивного лікування в поліклініці.