ПОРАЖЕНИЕ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ АКТИВАЦИИ СВОБОДНО РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ И ГЕМОСТАЗ

В.П.Мищенко, О.Н.Воскресенский, В.А.Дельва, Г.А.Крохмаль, О.Н. Новикова, Т.А.Девяткина, Л.Л.Гончаренко, Е.Л.Еремина, Н.В.Бречко, Г.А.Лобань, Т.В.Новосельцева, В.Н.Бобырев, Т.И .Устянская, А.И.Подтереба, Л.А.Муляр

Медицинский стоматологический институт, Полтава

В результате перекисного окисления липидов мембран происходит активация эндоперекисей простагланди нов и тромбоксанов, а также ингибирование простациклина сосудистой стенки . Исследованиями проведенными нами на различных лабораторных животных установлено, что при избыточном питании гиподинамии стресса и других реакциях наблюдается повышение уровня свободнорадикального окисления липидов приводящее к значительному изменению активности плазменных, эритроцитарных ,тканевых (аорты) факторов свертывания крови и простациклина.

ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЁНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

А.А.Мкртчян, М.Б.Дюнц, А.Р.Мурадян, А.З .Карапетян

Целью настоящей работы является изучение состояния свертывающей и антисвертывающей систем крови, степень структурных и анатомических изменений пораженных вен и гемодинамической характеристики больных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Работа основана на анализе данных комплексного обследования

ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ических изменений пораженных вен и гемодинамической характеристики больных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Работа основана на анализе данных комплексного обсле-