

Міністерство охорони здоров'я України
Українська медична стоматологічна академія

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ
МЕДИЦИНИ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ**

Матеріали доповідей
наукової конференції
20 травня 1996 року

Полтава - 1996

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ У ЖЕНЩИН С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

И.В.Редчиц, Е.Е.Петров, Ю.М.Гольденберг

Украинская медицинская стоматологическая академия, г.Полтава

Среди причин, способствующих развитию язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) у женщин, ряд авторов отводят важное место гинекологической патологии, прежде всего нарушениям гормональной функции яичников.

Нами в условиях стационара обследовано 115 женщин, страдающих ЯБДК. Гинекологическая патология (фибромиома матки, аднекситы, дисфункции яичников и др.) отмечена у 46 (40,0%) женщин, из которых 16 (34,6%) перенесли оперативное вмешательство.

Аборты наблюдались у 74 (64,3%) женщин, причем у 9 женщин из 23 (39,4%) они сопровождались обострением заболевания, диагностированного ранее. 6 (5,2%) женщин (все репродуктивного возраста) указывали на аборт как на непосредственную, по их мнению, причину возникновения ЯБДК.

И, наоборот, беременность положительно влияла на течение ЯБДК. 8 женщин из 13 (61,5%), начало заболевания у которых предшествовало последующим беременностям, отмечали стойкую ремиссию ЯБДК в период беременности, продолжающуюся и в послеродовом периоде.

Вместе с тем, связь возникновения ЯБДК у женщин с нарушением гормональной функции яичников, изменением гормонального фона является, на наш взгляд, совсем не простой и отнюдь не безоговорочной. Далеко не все женщины в климактерическом периоде, что многие связывают с дисфункцией яичников в это время, заболевают ЯБДК. Более того, в предыдущих работах (Е.Е.Петров, И.В.Редчиц, 1994) нами показано, что распространенность ЯБДК среди женщин зрелого и среднего возраста оказалась почти одинаковой. Кроме того, такие данные гинекологического анамнеза, как аборт, перенесенные операции по поводу фибромиомы или кисты яичников могут приводить к тяжелым нервнопсихическим переживаниям и даже стрессовым состояниям, которые сами по себе, вне какой-либо связи с возникающими гормональными нарушениями могут способствовать возникновению ЯБДК.

Не отрицая важной роли гормонального механизма в развитии ЯБДК у женщин, мы считаем более целесообразным комплексный подход к изучению различных патогенетических звеньев заболевания.