

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

К И Е В – 1 9 9 1

У Д К 616.314.17-008.1-084-057.875

ВЫПУСК 2

по проблеме «Стоматология»

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

УТВЕРЖЕНО
РПК «Стоматология»
Протокол № 1 от 09,01,91г.

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА

С целью первичной и вторичной профилактики заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста предлагается комплекс профилактических и лечебных мер для студентов вузов. Согласно комплекса, все студенты первого курса берутся на диспансерный учет и распределяются на 6 групп:

- I - практически здоровые / зубы и пародонт интактные или КПУ ≤ 6 , отсутствует соматическая патология/ ;
- II- группа риска /КПУ>6, интактный пародонт, наличие фоновой патологии/ ;
- III-лица, имеющие папиллит или гингивит без органной патологии;
- IV- лица с наличием папиллита или гингивита на фоне соматической патологии;
- V - лица, имеющие пародонтит без фоновой патологии;
- VI - лица, имеющие пародонтит с сопутствующей общесоматической патологией.

Во всех группах обязательными являются рекомендации по режиму дня, характеру питания соответственно возрасту с увеличением содержания кальция в пище /в регионах с низким содержанием кальция в питьевой воде/, рациональному и правильному уходу за полостью рта, аутотренингу, пальцевому массажу десен; санация полости рта в зависимости от степени компенсации кариеса; прием ундевита по 1 драже 2 раза в день в течение 24 дней. Кроме того, во 2-4 группах назначается глицерофосфат кальция по 1 таблетке 3 раза в день одновременно с приемом поливитаминов, а в III- IV группах обязательно устранение местных раздражителей /зубные отложения, нерациональные протезы, неполноценные пломбы, травматическая окклюзия, патология прикуса/.

Дополнительно в группах проводится:

- I группа – лечение фоновой соматической патологии у терапевта;
- III группа – инстиллянии или аппликации раствора ротокана согласно прилагаемой к препарату инструкции, полоскания полости рта настойка-

ми календулы и эвкалипта по 1/2ч.л. на стакан воды 2 раза в день, электрофорез 5% раствора салицилата натрия №6 на область пораженного участка десны по 15мин при силе тока до 3мА, а при тяжелой степени гингивита дополнительно назначается контактная дерсонвализация №6 по 10мин на область воспаленной десны;

IV группа - то же, что в III группе и дополнительно лечебные повязки на десну с метацилаевитовой или гастрофармаевитовой пастой, лечение соматической патологии у терапевта;

V группа - инстилляциии раствора ротокана в зубодесневые карманы, лечебные повязки с метацилаевитой пастой, полоскания полости рта настойками календулы и эвкалипта, электрофорез 5% раствора салицилата натрия по 15 мин. при силе тока до 3мА в сочетании с УФО №6-12 0,5-2 биодозы на область пораженного участка десны;

VI группа – лечение симптоматического пародонтита соответственно характеру основной общесоматической патологии, лечение фоновой общей патологии у соответствующего специалиста.

Предлагаемые профилактические меры и лечебные воздействия необходимо проводить 2 раза в год /ноябрь, апрель/.

Информационное письмо составлено по материалам отраслевого СИФ республики

СОСТАВИТЕЛИ: асп. Т.А.Петрушанко, доц.Г.Ф.Просандеева, асс.В.Н. Артюх

/ПОЛТАВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ/

Ответственный за выпуск: проф.А.Р. Уваренко

Подписано к печати 19.03.1991г. Печ.л. 0,13

Уч.-изд.л. 0,08

Тираж 105 экз.

Заказ № 39

Фотоофсетная лаборатория РЦНМИ МЗ УССР, 252650, г.К и е в – 22,
Г С П, ул. Горького, 19/21.