

ПРОФІЛАКТИКА ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ В ПОРОЖНИНІ РОТА

Степанюк О.

Науковий керівник: ас. Тимошенко Ю.

Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Полтавський державний медичний університет

Герпес – поширена вірусна інфекція, що посідає чільне місце серед вірусних захворювань людини.

За міжнародною класифікацією хвороб та проблем (МКБ-10, Женева, 1995 р.) це захворювання реєструється як «острий герпетичний стоматит» (ОГС). При цьому йому властиво переходити в хронічну форму з періодичними рецидивами, різними за клінічними проявами.

Серед хронічних форм герпетичного ураження нами виділено особливу форму клінічних проявів, що спостерігається після тривалих стоматологічних маніпуляцій – «герпес напруги».

Метою нашого дослідження стала розробка та впровадження схеми профілактичних заходів герпетичної інфекції з високою ймовірністю виникнення герпесу напруги після стоматологічного прийому.

Нами обстежено 15 пацієнтів віком від 20 до 45 років. Діагноз ставили на підставі скарг, анамнезу, заповнення розробленої таблиці прогнозування загострення хронічного герпесу, а також проведених загальноклінічних лабораторних, мікробіологічних та імунологічних досліджень.

Пацієнтам, у яких за даними аналізів та таблиці, ймовірність загострення становила 60% і більше, призначалася схема профілактичних заходів. Вона включає препарати з протівірусною, інтерфероніндукуючою активністю, гіпосинсидізуючі, пробіотики, препарати кальцію та вітаміни.

Після застосування цієї схеми у 85% пацієнтів отримано позитивні результати. У цієї групи пацієнтів, за даними прогнозування, була висока ймовірність загострення хронічного рецидивуючого герпесу. Надалі протягом 1,5-2 років, при тривалих реставраційних, ендодонтичних та ортопедичних роботах на прийомі у лікаря стоматолога, проявів герпесу напруги не спостерігалось.