

# ГІРУДОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРОЗНОГО ТА ХРОНІЧНОГО ГІПЕРПЛАСТИЧНОГО ЛІМФАДЕНІТУ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ В ДІТЕЙ

*Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”*

*О.В. Гуржій, С.О. Білоконь, А.М. Гоголь*

Незважаючи на здобутки сучасної медичної науки, кількість хворих на запальні процеси щелепно-лицевої ділянки невпинно зростає, і найчастіше, за даними нашої клініки, це стосується лімфаденітів, які складають 26,5% від загальної кількості госпіталізованих дітей із запальними процесами.

Метою нашого дослідження стало використання гірудотерапії для підвищення ефективності лікування дітей з гострим серозним і хронічним гіперпластичним лімфаденітом неодонтогенного походження (18 і 21 пацієнтів відповідно).

Лікування хворих із використанням гірудотерапії проводили в умовах хірургічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. Застосовували аспіраційний метод. Експозиція складала в середньому від 20 до 40 хвилин, курс лікування - 2-3 сеанси з інтервалом в 1-2 дні. Після процедури на ранову поверхню накладали асептичну пов'язку.

В порівнянні з контрольною групою хворих поліпшення загального стану, нормалізація температури тіла, зменшення ознак інфільтрації та колатерального набряку м'яких тканин у відповідній ділянці, зникнення болючості в дітей, яким застосовували гірудотерапію, спостерігалися в більш короткі терміни. Тому її можна використовувати як допоміжний метод у комплексному лікуванні гострого серозного та хронічного гіперпластичного лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки в дітей.