

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ

Н.В.Берчун

Українська медична стоматологічна академія. Полтава

Мета дослідження – вивчення впливу періодичної нормо баричної гіпоксії (ПНГ) на перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) у поєднанні з хронічним обструктивним бронхітом (ХОБ) та у період нестійкої ремісії.

Комплексне лікування з застосуванням методу ПНГ проведено 25 пацієнтам з ІХС з супутнім ХОБ. До цієї групи увійшло 9 жінок та 16 чоловіків середнього віку, зі стабільною стенокардією напруження I ФК у 12 хворих, II ФК – у 13; серцевою недостатністю I стадії – у 8 з них, II стадії – у 17. ХОБ період нестійкої ремісії визначали практично в усіх хворих. Курс ПНГ проводили на фоні базисної терапії (нітрати, гіпотензивні препарати, бронхолітики) з використанням дворазової суміші, яка містить $10\pm 1\%$ кисню та $90\pm 1\%$ азоту – ГГС – 10 (ГОСТ 9293-74).