



# МАТЕРІАЛИ III (X) З'їзду Асоціації стоматологів України

(16–18 жовтня 2008 р., м. Полтава)





---

---

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

# **ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - В СТОМАТОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ**

**МАТЕРІАЛИ ІІІ (Х) З'ІЗДУ  
АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ**

Полтава • "Дивосвіт" • 2008

Особливості постановки штучних зубів з метою підвищення стабілізації повного знімного протеза на нижній щелепі та покращення функціонування язика <i>Семененко І. П., Єрис Л. Б.</i> .....	439
Особливість конструкції мостоподібного протеза при протезуванні малих дефектів третього класу в осіб з остеопорозом <i>Силенко Ю. І., Хребор М. В., Бусло А. М., Ступницький Р. М., Колісник Д. А.</i> .....	440
Фактори, що визначають тактику реабілітації пацієнтів із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепі <i>Смаглюк В. І., Смаглюк Л. В.</i> .....	441
Підвищення якості полімерних матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології, шляхом удосконалення технології підготовки їх із застосуванням ультразвукової обробки <i>Соколовська В. М.</i> .....	442
Деякі основні вимоги до дентальних сплавів металів <i>Струк В. І., Король М. Д.</i> .....	442
Безпосереднє протезування: переваги та недоліки <i>Тесленко О. І.</i> .....	443
Потенциометрические методи в обстеженні пацієнтів с наличием в полости рта металлических включений, фиксированных на дентальных имплантатах <i>Тимофеев А. А., Каминский В. В., Ярифа М. А., Лысенко А. С.</i> .....	444
Клінічні способи виготовлення тимчасових коронок <i>Ткаченко І. М., Писаренко О. А., Коробейников Л. С.</i> .....	445
Распределение жевательного давления при протезировании концевых дефектов зубных рядов с использованием замковых креплений <i>Тумакова Е. Б., Дворник В. Н.</i> .....	445
Особливості рентгенодіагностики при плануванні імплантологічного втручання <i>Угрин М. М., Солонько М. Ю.</i> .....	446
Гігієнічна оцінка безпеки конструкцій у ортопедичній стоматології <i>Філатов І. В.</i> .....	447
Удосконалений пристрій для знімання мостоподібних протезів <i>Хопта Р. М., Ожоган З. Р., Мізюк Л. В.</i> .....	448
Нові підходи до визначення ступеня атрофії тканин протезного ложа при користуванні знімними пластинковими протезами з акрилатів <i>Хребор М. В., Силенко Ю. І.</i> .....	448
Якісні показники препарування інтактних та депульпованих зубів <i>Цветкова Н. В.</i> .....	449
Методи запобігання негативному впливу препарування на опорні зуби при виготовленні незнімних конструкцій протезів <i>Цветкова Н. В.</i> .....	450
Стан відпрепарованої поверхні інтактних та депульпованих опорних зубів при протезуванні незнімними конструкціями <i>Цветкова Н. В.</i> .....	450
Кровонаповнення судин тканин протезного ложа пацієнтів до та після фіксації протезів на субперіостальні імплантати <i>Чертов С. О., Король М. Д.</i> .....	451
Роль визначення задоволеності хворого зубними протезами при дослідженні мовленнєвої адаптації <i>Чикор В. П.</i> .....	452
Палатографія як метод дослідження адаптації до повних знімних зубних протезів <i>Чикор В. П.</i> .....	452
Дослідження звукопоглинання базисної пластмаси "Фторакс" <i>Чикор Т. О.</i> .....	453
Порушення вимовляння приголосних звуків хворими з повною відсутністю зубів на верхній щелепі <i>Чикор Т. О.</i> .....	454

# РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ХВОРОГО ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МОВЛЕННЕВОЇ АДАПТАЦІЇ

Чикор В. П.

м. Полтава

Відомо, що звикання хворого до зубних протезів є складним адаптаційним процесом. Велику роль у ньому відіграють психологічні фактори. Провідне місце таких факторів відзначали С. Попов, С. Стайков (1985), В. Железков (1965), В. Bergman та G. Carlsson (1985). Підсумовуючи їхні погляди з цього питання, Н. В. Калініна та В. А. Загорський (1990) визначають психологічні аспекти адаптації як суму складних умовно-рефлекторних реакцій хворого, котрі належать до сфери людських емоцій і визначають ступінь задоволеності хворого протезами.

Указують, що швидкість адаптації до знімних зубних протезів значною мірою залежить від ставлення хворого до протезування (Petz R., 1987). Рекомендують навіть застосовувати психологічну підготовку пацієнтів до протезування (Корж В. И., 2002). Особливе значення психоемоційний фон має для розвитку мовної адаптації – відновлення нормального вимовляння звуків хворим-протезоносієм.

**Мета роботи:** розробити анкету для визначення ставлення хворого до протезування та його ступеня задоволеності протезами.

Розроблена анкета складається з паспортної частини й запитань, які стосуються суб'єктивних вражень пацієнта від протезування.

У паспортній частині зазначають прізвище, рік народження, адресу, місце роботи й посаду.

Друга частина анкети складається з десяти пунктів. Хворому пропонують відповісти на такі запитання:

1. Користувались протезами раніше?
2. Скільки років користувалися протезами?
3. Скільки разів виготовляли протези?
4. Чи вдало ви користувалися протезом спочатку?
5. Чи проводились поправки протезів під час користування?
6. Яким протезам Ви надаєте перевагу?
7. Що є для Вас першочерговим?
8. Як Ви ставитесь до свого майбутнього протеза?
9. Як Ви оцінюєте своє звикання до протезів?
10. На який день, на Вану думку, відновилося мовлення?

На перше, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте та десяте запитання наведено варіанти відповідей. Така форма анкети не складна в користуванні. Питання сформульовані чітко, лаконічно. На них можуть бути дані однозначні відповіді. Це дозволяє результати анкетування піддавати статистичній обробці з метою визначення ступеня задоволеності хворих протезами. Центральне місце в анкеті займає питання про першорядність відновлення однієї з трьох порушених функцій: жування, мовлення й естетичних форм обличчя. Анкету апробовано в ході обстеження й клінічного спостереження за 22 хворими із знімними пластинковими протезами й мостоподібними конструкціями. За даними анкетування встановлено, що 73% (16 хворих) вказують на важливість відновлення нормального вимовляння звуків. Більше половини пацієнтів при середньому рівні задоволеності протезами (3–4 бали) відзначили, що мовлення в них відновилося в межах 10–15 діб після першого накладання протеза.

Таким чином, запропонована анкета може бути використана для визначення ставлення стоматологічного хворого до протеза і його задоволеності ним, як фактора, що відіграє роль у мовній адаптації.

---

## ПАЛАТОГРАФІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

Чикор В. П.

м. Полтава

Відомо, що порушення мовленнєвої функції – характерна скарга ортопедичних стоматологічних хворих. Відновлення мовлення є одним з головних завдань при застосуванні повних знімних зубних протезів. Описано, що поряд з іншими методами якість ПЗЗП може бути оцінена за допомогою палатог-