КЛИНИЧЕСКИЕ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ПАРОТИТА У ДЕТЕЙ

О.В. Рыбалов, И.В. Яценко

С целью определения исходов хронического паренхиматозного паротита (ХПП), впервые проявившего себя в детском возрасте, нами было проведено динамическое (от 3 до 14 лет) клиническое и рентгенологическое исследование состояния 66 околоушных желез (ОУЖ) у 55 пациентов. Возраст обследуемых составил от 3 до 32 лет. Всего проведено 252 сиалографии с количеством исследований от 2 до 10 на одного больного.

Согласно клиническим проявлениям ХППациенты были разделены на две подгруппы: с активным (11 больных -13 ОУЖ) и торпидным течением (44 больных – 53 ОУЖ).

Рентгенологическое исследование проводили непосредственно после введения в проток контрастного вещества (30% йодолипола) в двух проекциях – боковой и прямой (носо-лобной).

В результате длительного клинического наблюдения с применением общих методов исследования было определено, что у лиц с активным течением ХПП в 87,5% случаев состояние оставалось без перемен. У 12,5% пациентов отмечалось стойкое улучшение.

У 23,1% обследованных с торпидным течением процесса исходом заболевания было выздоровление, у 76,9% - отмечалось стойкое улучшение. Ухудшения состояния ни у одного больного не выявлялось.

При изучении динамики рентгенологической картины оказалось, что у 15 больных с активным течением процесса (53,8% исследуемых желез) сиалографическая картина оставалась без изменений, у 6 человек (46,2%) отмечалось уменьшение числа сиалэктазов.

У 11 больных с торпидным течением ХПП (22,64% исследуемых желез) произошло исчезновение полостей, у 25 больных (54,72%)число сиалэктазов

уменьшилось, у 8 пациентов (22,04%) – сиалографическая картина оставалась без изменений.

Сопоставляя клинические и рентгенологические данные, можно сделать вывод, что динамика клинических проявлений у 32,6% больных с активным и у 22,64% с торпидным течением ХПП не соответствует динамике сиалографической картины.