

ОСЛОЖНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Н.А. Соколова

Целью настоящей работы явилась диагностика осложнений у больных, получивших лучевую терапию по поводу злокачественных опухолей челюстно-лицевой локализации.

За 6 месяцев 1992 года были исследованы 40 больных разного возраста (от 20 до 68 лет), получавших лучевую терапию области головы и шеи. У всех 40 больных в различное время от начала возникали, как правило, повышение вязкости слюны, прогрессирующее нарастание сухости во рту, жжение языка и потеря вкусовых ощущений, появлялась гиперемия слизистой оболочки полости рта. При осмотре определялись признаки очагового пленчатого эпителиита слизистой оболочки губ, щек, языка, небных дужек: вначале появлялась гиперемия слизистой оболочки, затем побледнение и потеря блеска, десквамация эпителия в отдельных участках, эрозии с некротическим налетом. У некоторых больных отторгались участки эпителия и одиночные эрозии сливались в обширные участки.

Кроме местных осложнений отмечались и общие: тошнота, ухудшение аппетита. У некоторых больных были выявлены изменения в крови в виде лейкопении.

Таким образом, несмотря на кажущуюся доступность лечения опухолей челюстно-лицевой локализации, проведение лучевой терапии сопровождается многими трудностями, которые входят в компетенцию не только онколога, но и стоматолога.