

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА

Л.И.Дубовая

В настоящее время отмечается рост числа пациентов, негативно относящихся к стоматологическому лечению из-за страха боли. Особенно опасна дентофобия у лиц молодого возраста, так как развитие осложнений кариеса представляет в дальнейшем угрозу здоровью.

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи стоматологической тревожности и интенсивности кариозного процесса.

Объекты и методы исследования. Обследовано 146 мужчин и 157 женщин в возрасте 20-24 года. Стоматологическая тревожность определялась с помощью тестирования опросником МОЛТ (1991), выделяли лиц с низкой, средней и высокой тревожностью в отношении стоматологического лечения. Для определения интенсивности кариозного процесса вычисляли индекс КПУ (ВОЗ, 1983). При сборе анамнеза отмечали пациентов, лечивших ранее осложненный кариес (пульпит и другие заболевания, лечение которых сопровождалось сильной болью).

Результаты исследований. Выявлено, что как у мужчин, так и у женщин данной возрастной группы, отсутствует прямая зависимость между уровнем тревожности и числом зубов, пораженных кариесом (индекс КПУ), однако лица с высокой тревожностью значительно чаще лечили осложнения кариеса (пульпит, периодонтит), лечение которых было резко болезненным.

Выводы. Степень выраженности стоматологической тревожности у лиц молодого возраста зависит не от числа кариозных зубов.