ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ К CAMOЛЕЧЕНИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ INVESTIGATION OF THE PATIENTS RELATION TO MEDICINES APPLICATION

Каптанова О. А., Новосельцева Т. В. Kashtanova O., Novoselzheva T.

ОГУЗ «Центр качества лекарственных средств» ГОУ ВПО AГMA, г. Астрахань, Россия The Center of medicines quality, Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, Russia

Цель: Изучить отношение населения к самолечению и определить причины и спектр выбора препаратов.

Материалы и методы: Сотрудниками фармацевтической справочной ОГУЗ ЦКЛС был проведен социологический телефонный опрос, направленный на изучение отношения населения к самолечению. Опрос проводился с февраля по апрель месяц 2010 г. За этот период было опрошено 550 респондентов. 82% респондентов считают, что состояние их здоровья зависит прежде всего от личных усилий, направленных на соблюдение здорового образа жизни.

Результаты: В результате выяснено, что из опрашиваемых 58% составили женщины и 42% — мужчины. Средний возраст респондента составил 42 года, из них работающих — 58%.

Чаще всего опрашиваемые посещают доктора не реже одного раза в полгода (43% респондентов), один раз в год — 25% и, к сожалению, 32% анкетируемых обращаются реже одного раза в год. При этом у 39% респондентов вызывает затруднение попасть на прием к врачу, у 37% - иногда вызывает и лишь 24% отвечают, что не имеют затруднений.

Было выяснено, что только 32% опрошенного населения поступят адекватно и обращаются за помощью к врачу, небольшая часть (5%) консультируется с фармацевтом, а остальные 33% занимаются самолечением с использованием народных средств, трав, препаратов, хранящихся в домашней аптечке или обратятся к близким за советом, а 25% опрошенного населения обращаются в справочную за консультацией по препарату в определенной ситуации. Хотелось бы отметить, что 5% респондентов доверяют и прислушиваются к рекламе на радио, телевидению, в газете, Интернете.

В фармацевтическую справочную обращались пациенты, которые хотели приобрести без рецепта лекарственные средства из разных фармгрупп. Основными причинами обращения за данным лекарственным средством являлись:

- постоянное применение при хронических заболеваниях;
- лекарственное средство ранее применялось, или ранее назначалось, врачом.

Пользуются спросом при самолечении следующие фармгруппы:

- 1. Группа НПВС их доля составляет 20%. Из них наиболее часто спрашивают: Вольтарен, Мовалис, Кетанов. Основная причина выбора этих препаратов наличие собственного опыта применения.
- 2. На втором месте находятся препараты для лечения ЖКТ, их доля составила 19%. Лидирующие позиции занимают: Омепразол, Ранитидин, Гастал, Мезим, Линекс.
- 3. На третьем месте антигистаминные препараты 14%: Супрастин, Тавегил, Димедрол, Лоратадин. Причины спроса наличие собственного опыта применения, низкая стоимость, давняя известность препаратов.
- 4. Четвертое место занимают антигипертензивные препараты и периферические вазодилататоры, их доля составила 11%. Эта группа препаратов имеет спрос у опрошенных в возрасте 43 лет. При этом обращение за перечисленными группами ЛС, как правило, мотивируют длительным применением и первоначальным назначением врача.
- 5. Пятую группу разделяют антибиотики и противовирусные средства. На их долю пришлось 10% ответов.
- 6. Шестое место занимают противокашлевые и отхаркивающие препараты. Основная причина такого спроса эффективность и наличие собственного опыта применения.
- 7. Седьмое место занимают средства, улучшающие мозговое кровообращение. Они составили 8% опрошенных. Среди причин обращения за данными ЛС длительный прием, особенно в пожилом возрасте; наличие собственного опыта применения, а также первоначальное назначение врачом.
- 8. На восьмом месте находятся гормональные контрацептивы, что составило 5%.
- 9. По 1% получили такие группы, как диуретики, ангиопротекторы, противогрибковые и противоглистные препараты.

При самолечении 95% респондентов придерживаются инструкции по применению. При этом осложнения (аллергические реакции, брадикардия, головная боль, тошнота, рвота) при самолечении возникали у 15% опрошенных респондентов.

Выводы. Вероятность самостоятельного применения лекарственных средств населением нашего города очень высока, что создает риски развития побочных реакций либо возможного лекарственного взаимодействия, т. к. в большинстве случаев самолечение проводится без медицинского наблюдения. Это обуславливает важную роль фармацевта в надлежащем и качественном информировании и консультировании посетителей аптек.