

1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ДИСЛІПІДЕМІЇ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ.
2. НДР «Розробка нових методів профілактики, лікування та реабілітації захворювань органів травлення у хворих з поліморбідною патологією на підставі вивчення патогенетичних ланок формування синтропії». 0111U004881, 2010-2015pp.
3. Терапія.
4. 2+, С.
5. Патент України на корисну модель №101141. МПКА61К 31/00. Спосіб корекції дисліпідемії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / Скрипник І.М., Дубровінська Т.В., Люлька Н.О. (UA).-№ u201502636; заявл. 23.03.2015; опубл. 25.08.2015, бюл. № 16.
6. Скрипник І.М. Оцінка ефективності та безпечності довготривалого лікування аторвастатином у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / І.М. Скрипник, Т.В. Дубровінська // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3, Т. 1 (102). – С. 205-210. Скрыпник И.Н. Оптимизация длительной гиполипидемической терапии у больных инфарктом миокарда в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом / И.Н. Скрыпник, Т.В. Дубровинская, Э.В. Оганисян // Georgian Medical News. – 2014. – № 4 (229). – С. 53-58.
7. Спосіб корекції дисліпідемії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, що включає використання комбінації лікарського засобу аторвастатину та препарату урсодезоксихолевої кислоти, на фоні базисної терапії, який відрізняється тим, що, в залежності від рівнів показників ліпідограми, аторвастатин призначають перорально по 40 мг/добу після вживання їжі на ніч, а урсодезоксихолеву кислоту – перорально у дозі 15 мг/кг на добу у 2 прийоми протягом 9 місяців.
8. Запропонований спосіб лікування інфаркту міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, шляхом комбінації аторвастатину в дозі 40 мг/добу з урсодезоксихолевою кислотою 15 мкг/кг/добу, дозволяє ефективно знизити ризик виникнення серцево-судинних ускладнень шляхом досягнення цільових рівнів ліпідограми та С-реактивного протеїну при застосуванні безпечних середніх доз аторвастатину та запобігає виникненню побічних ефектів даного препарату, зокрема, на гепатобіліарну систему, навіть при довготривалому прийомі.
9. Препарати аторвастатин 40 мг і урсодезоксихолева кислота 15 мкг/кг/добу.
10. Хворі на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, які на фоні базисної терапії та застосування аторвастатину у добовій дозі 40 мг, не досягли цільових рівнів ліпідограми.
11. Підвищена чутливість до розувастатину та урсодезоксихолевої кислоти або до будь-якого компонента таблеток; захворювання печінки в активній фазі, включаючи стійке підвищення рівнів трансаміназ, яке неможливо пояснити, та будь-яке підвищення активності трансаміназ понад 3 верхні межі норми; гострі запальні захворювання жовчних шляхів, цироз печінки в стадії декомпенсації; виражене порушення функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв.); міопатія, схильність до розвитку міотоксичних ускладнень; вагітність та лактація;
12. Немає.
13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».
14. Немає.
15. Скрипник І.М., Дубровінська Т.В. (0997653777). Люлька Н.О.

Ресстр. № 573/2/15