

Міністерство охорони здоров'я України
Полтавський державний медичний
стоматологічний інститут

«Актуальні питання стоматології дитячого віку і ортодонтії»

Республіканська наукова
конференція
Матеріали доповідей
24 - 25 листопада 1993 року,
м. Полтава

РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ МНОГОКОРНЕВЫХ ЗУБОВ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ

Л.Я. Богашова, Т.П. Скрипникова, Л.М. Саяпина

*Полтавский государственный медицинский
стоматологический институт, г. Полтава, Украина*

Операция резекции верхушки корня является одним из методов лечения хронического периодонтита. А.И. Евдокимов (1972) рекомендует производить эту операцию при хроническом периодонтите как в однокорневых, так и в многокорневых зубах. Однако на практике в основном применяется эта операция при патологии в однокорневых зубах, по-видимому, из-за опасности вскрытия гайморовой полости во время операции.

В то же время при консервативном лечении не всегда удается полноценно пломбировать щечные каналы первых и вторых моляров верхней челюсти. В связи с этим у больных после лечения через 1-2 месяца появляется боль при накусывании, а также четко отграниченное опухолевидное образование у проекции верхушек корней. Слизистая оболочка в этом участке синюшна, пастозна, в ряде случаев она без видимых изменений. На рентгенограмме определяется деструкция костной ткани с нечеткими контурами разной величины, у верхушки одного или обеих корней.

Целью нашего исследования явилось хирургическое лечение субпериостальной гранулемы многокорневых зубов. Произведенная операция — резекция верхушек щечных корней у 8 пациентов прошла без осложнений. Послеоперационный период протекал гладко. Отдаленные результаты прослежены на протяжении 6 месяцев, осложнений не выявлено.