

загальні засоби профілактики карієсу, захворювань пародонту та ін. Це дає можливість зменшити роз-

повоюджених та інтенсивність стоматологічних захворювань у цієї групи дітей.

УДК 616.314-0.84.454.1

ВИКОРИСТАННЯ ЗУБНОЇ ПАСТИ "БЛЕНД-А-МЕД" В ПРОФІЛАКТИЦІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З ФАКТОРАМИ РИЗИКУ

А.Г.Павленко, А.Ф.Каськова, О.В.Шешукова, Ю.І.Журавльова
Українська медична стоматологічна академія, м.Полтава

Профілактика карієсу і захворювань пародонту є нагальною проблемою стоматології, оскільки поширеність їх збільшується.

До багатьох чинників, які сприяють виникненню цих стоматологічних захворювань відноситься і погіршення екологічного стану навколишнього середовища, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Діти, що народилися від ліквідаторів аварії, мають високу розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів (Каськова Л.Ф., 1984) та захворювань тканин пародонту, що потребує проведення у них інтенсивних профілактичних заходів.

Метою дослідження було визначення впливу зубної пасти "Бленд-а-мед" на гігієнічний стан ротової порожнини, тверді тканини зуба, тканини пародонту. Нами було проведено обстеження 20 дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС 7-8 років. У 5 дітей виявлені вісім ділянок демінералізації емалі, у 6 дітей позитивною була проба Писарева-Шиллера. Стан гігієни порожнини рота у всіх дітей був

"незадовільний". Всі діти були навчені гігієні ротової порожнини, для них проведені уроки гігієни, контрольована чистка зубів. Протягом місяця діти чистили зуби пастою "Бленд-а-мед". Через місяць стан гігієни ротової порожнини змінився з "незадовільного" на "задовільний". При другому обстеженні ділянок демінералізації емалі виявлено не було. Стан тканин пародонту у дітей під впливом адекватної гігієни порожнини рота покращився; ознаки хронічного запалення ясен зникли, зменшився індекс РМА у 5 разів.

На основі отриманих попередніх результатів можна зробити висновок про сприятливий вплив зубної пасти "Бленд-а-мед" на гігієнічний стан ротової порожнини, тверді тканини зубів, тканини пародонту 7-8 річних дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що постійно проживають в м.Полтава. Виходячи з цього, зубну пасту "Бленд-а-мед" можна рекомендувати для використання в системі профілактичних заходів для цих дітей.

УДК 616.342-002.44+616.995.122.21

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ЕЕ С ОПИСТОРХОЗОМ

В.М.Потяженко

Українська медична стоматологічна академія м.Полтава

Сочетание язвенной болезни с описторхозом довольно часто встречается в географических зонах, где распространена описторхозная инвазия. Нами проанализированы истории болезни 19 больных наблюдавшихся в клинике с 1995 по 1998 годы, у которых была выявлена микст-патология.

К клиническим особенностям течения ЯБ на фоне описторхоза следует отнести меньшую частоту типичных для язвенной болезни болей, хронологически связанных с приемом пищи и значительно большую частоту постоянных болей, которые лока-

лизуются как в эпигастральной области, так и в правом подреберье, у 17 больных. Менее характерна сезонность обострения ЯБ для микст-патологии. Для этих больных характерны симптомы поражения гепатобилиарной системы. Гиперацидитас и гиперсекреция для этой группы больных были не характерны, в отличие от больных с ЯБ без описторхозной инвазии. У 15 больных отмечалась эозинофилия и повышенная СОЭ.

При рентгеноскопическом и эндоскопическом исследовании значительно чаще при микст-