

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ.

2 НДР «Клініко-функціональні та морфологічні особливості перебігу захворювань респіраторної системи (туберкульозу, саркоїдозу, дисемінованих процесів та ХНЗЛ) на різних етапах лікування, реабілітації та профілактики», 01150U008151, 2015-2019 рр.

3. Внутрішні хвороби.

4. 2+, С.

5. Деклараційний патент України на корисну модель №95356 МПК А61К 31/215, А61К 31/275. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. / Ішейкін К.Є., Потяженко М.М., Люлька Н.О., Соколюк Н.Л., Хайменова Г.С., Лубровінська Т.В.; U201406354 заявл. 10.06.2014; опубл. 25.12.2014. Бюл. № 24. – 4 с.

6. Ишейкин К. Е. Современные тенденции терапии коморбидных состояний / К. Е. Ишейкин, М.М. Потяженко, Н.О. Люлька, Н.Л. Соколюк, Г. С. Хайменова // Georgian Medical News. - Грузия, 2014. –№ 10 (235). - С. 49-53.

7. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, що включає призначення антигіпертензивних препаратів першої лінії лікування артеріальної гіпертензії який, відрізняється тим, що в якості антигіпертензивних препаратів призначають селективний блокатор кальцієвих каналів амлодипін (нормодипін) та селективний антагоніст рецепторів (тип АТІ) ангіотензину II кардосал (олмесартан), за схемою, амлодипін по 5 мг вранці, кардосал (олмесартан) по 10 мг в обід після прийому їжі, протягом часу, достатнього для одержання позитивного ефекту.

8. Запропонована схема лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, амлодипін по 5 мг вранці, кардосал (олмесартан) по 10 мг в обід після прийому їжі, забезпечує максимальний лікувальний ефект з мінімальними побічними явищами, покращує поточні та віддалені наслідки лікування.

9. Селективний блокатор кальцієвих каналів амлодипін (нормодипін) по 5 мг та селективний антагоніст рецепторів (тип АТІ) ангіотензину II кардосал (олмесартан) по 10 мг.

10. Амлодипін застосовують для лікування артеріальної гіпертензії у дорослих, лікування стенокардії напруги, стенокардії Принцметала (вазоспастична стенокардія). Лікування ішемічної хвороби серця, у тому числі хронічної. Препарат можна використовувати у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та бронхіальною астмою, хронічним обструктивним захворюванням легень. Кардосал застосовують для лікування артеріальної гіпертензії.

11. Непереносимість вказаних препаратів.

12. Немає.

13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

14. Немає.

15.1щайкін К.Є., Потяженко М.М., Люлька Н.О., Соколюк Н.Л., Хайменова Г.С.

(0991742316).

Реєстр. № 573/2/15