

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО НЕЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

О.В. Рыбалов, И.В. Яценко

С целью изучения морфо-функционального состояния околоушных желез на предмет возникновения в них хронического паренхиматозного паротита было обследовано 49 пациентов, ранее / от 2 до 13 лет назад / перенесших острый неэпидемический паротит. Контрольную группу составили 32 человека.

Исходы заболевания по отношению к околоушным железам, вовлекавшимся в воспалительный процесс зависели от клинимоρφологической формы имевшегося сиаденита. Острый серозный и гнойный паротит без абсцедирования не вызывает в слюнной железе выраженных морфо-функциональных нарушений. Гнойно некротический паротит исходом заболевания имеет частичное или полное склерозирование паренхимы со снижением био-функциональных способностей железы. Физико-химические свойства смешанной слюны и паротидного секрета, данные цитологического исследования, показатели свободнорадикального окисления смешанной слюны и паротидного секрета достоверно не изменялись, что подтверждает отсутствие хронического воспаления в ранее перенесших заболевание железах и поэтому можно утверждать, что эти острые заболевания околоушной железы не лежат в основе развития хронического паренхиматозного паротита.